



SIMULACRO UGT-SP-PV PARA CELADORES

1. La detención preventiva no podrá durar:

- a) Más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos.
- b) 72 horas.
- c) 48 horas
- d) Ninguna es correcta.

2. El órgano colegiado que ostenta la potestad ejecutiva y reglamentaria y dirige la Administración de la Generalitat es:

- a) El President
- b) El Consell
- c) Les Corts
- d) La Mesa

3. Son características fundamentales del Sistema Nacional de Salud:

- a) La extensión de sus servicios a toda la población.
- b) La organización adecuada para prestar una atención integral a la salud, comprensiva tanto de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad como de la curación y rehabilitación.
- c) La coordinación y, en su caso, la integración de todos los recursos sanitarios públicos en un dispositivo único.
- d) Todas son correctas

4. El personal de los SAIP dependerá orgánicamente de:

- a) La Dirección General con competencias en materia de atención al/a la paciente.
- b) La Gerencia de su Departamento de Salud.
- c) Del Comisionado de Sanidad del Departamento de Salud.
- d) La Conselleria de Sanidad.

5. Señala la respuesta más correcta según el decreto 126/1999, de 16 de agosto, del Gobierno Valenciano, por el que se crea el Sistema de Información Poblacional de la Conselleria de Sanidad:

- a) El Sistema de Información Poblacional de la Conselleria de Sanidad (SIP), es el registro que de información que reúne los datos de identificación, localización, acreditación de prestaciones sanitarias y de relación de todos los ciudadanos valencianos con los servicios de salud.
- b) El Sistema de Información Poblacional de la Conselleria de Sanidad (SIP), es el registro administrativo que reúne los datos de identificación, localización, acreditación de prestaciones sanitarias y de relación de todos los ciudadanos valencianos con los servicios de salud.
- c) El Sistema de Información Poblacional de la Conselleria de Sanidad (SIP), es el registro administrativo que reúne los datos de identificación, localización, acreditación de prestaciones sanitarias.
- d) El Sistema de Información Poblacional de la Conselleria de Sanidad (SIP), es el registro administrativo que reúne los datos de acreditación de prestaciones sanitarias y de relación de todos los ciudadanos valencianos con los servicios de salud.

6. Las fases de puesta en marcha de un equipo de trabajo son:

- a) 1.Primeras dificultades; 2 Acoplamiento; 3 Madurez; 4. Inicio; 5. Agotamiento.
- b) 1.Inicio; 2 Primeras dificultades; 3. Acoplamiento; 4. Madurez; 5. Agotamiento.
- c) 1.Primeras dificultades 2 Inicio; 3. Acoplamiento; 4. Madurez; 5. Agotamiento.
- d) 1.Acoplamiento; 2 Primeras dificultades; 3. Inicio; 4. Madurez; 5. Agotamiento.

7. Bañarán a los enfermos masculinos cuando no puedan hacerlo por sí mismos siempre de acuerdo con las instrucciones que reciban de:

- a) La enfermera o ayudante de planta.
- b) La supervisora de planta, servicios o enfermeras.
- c) Médicos y supervisoras.
- d) Supervisoras de plantas o servicios o personas que las sustituyan.

8. La Sra. J.M.F llega a puertas de urgencia con una ambulancia de Clase B, y se ha detenido a unos metros de la puerta de urgencias. Ergonómicamente y desde el punto de vista de la seguridad del paciente, la forma más correcta de trasladarlo con la camilla es:

- a) El celador irá de frente empujando de los pies.
- b) El celador irá de frente empujando del cabecero.
- c) El celador irá de espaldas tirando de los pies.
- d) El celador irá de espaldas tirando del cabecero.

9. En el Servicio de Urgencias se utiliza el triaje como un procedimiento médico destinado a obtener una clasificación de las víctimas en categorías. Atendiendo a los niveles de clasificación del Sistema Manchester (MTS), el nivel 3 de gravedad se corresponde con un tiempo máximo de atención de:

- a) 15 minutos.
- b) 30 minutos.
- c) 60 minutos.
- d) Inmediata.

10. En los traslados de la cama a la silla de ruedas cuando el paciente no colabora porque está imposibilitado, señale la respuesta correcta:

- a) Es suficiente con la ayuda de un celador.
- b) Se le pide al paciente que coloque su brazo por encima de los hombros del celador y éste a su vez, con el otro celador debe pasar sus brazos por debajo de las axilas del paciente tratando de rodear su cintura.
- c) Cada celador parará un brazo por debajo de la axila del enfermo y el otro por debajo del muslo. Los celadores se cogerán de las manos, y, poniéndose de acuerdo, levantarán al paciente al mismo tiempo hasta colocarlo en la silla.
- d) Se le pide al paciente que coloque su brazo por debajo de los hombros del celador y éste a su vez, con el otro celador debe pasar sus brazos por debajo de las axilas del paciente tratando de rodear su cintura.

11. No es función del celador:

- a) Pasar a las parturientas a la mesa de paritorio, colocándole las perneras si es preciso.
- b) Vigilará personalmente la limpieza de la Institución.
- c) Colaborará en las maniobras de reducción de pacientes psiquiátricos agitados.
- d) Ayudará al personal sanitario en la preparación de cadáveres.

12. Se encuentra en la Unidad de Hospitalización de Medicina Interna y va el celador a recoger al paciente M.S.I. para realizar un transporte intrahospitalario a Consultas Externas. La enfermera le comenta que el paciente puede ir en silla de ruedas. ¿Cómo actuará?

- a) Recogerá al paciente M.S.I. y empujará por detrás al paciente hasta el ascensor, en la entrada irá detrás y el paciente será el que entra primero en el ascensor y el último en salir.
- b) Recogerá al paciente M.S.I. y empujará por detrás la silla de ruedas con el paciente hasta el ascensor, para entrar en el ascensor el celador entrará primero tirando de la silla de espaldas al ascensor. Una vez dentro girará la silla para salir de la misma forma (sale primero el celador)
- c) Recogerá al paciente M.S.I. y empujará por detrás la silla hasta el ascensor, en la entrada al ascensor le da la vuelta a la silla y el celador será el que entra primero en el ascensor caminando hacia delante.
- d) Recogerá al paciente M.S.I. y empujará por detrás la silla de ruedas con el paciente hasta el ascensor, para entrar en el ascensor el celador entrará primero tirando de la silla de espaldas al ascensor. Para salir empujara desde atrás al paciente (sale primero el paciente).

13. En la técnica de desobstrucción de la vía aérea, si la obstrucción es parcial, en la actuación del paciente no se presentará:

- a) El gesto del llevarse las manos a la garganta.
- b) En poco tiempo una inconsciencia.
- c) Un nivel consciencia alterado en un primer momento.
- d) Tos o pitos.

14. La supervisora nos indica que, incorporemos y hagamos un cambio postural con la sabana deslizante o entremetida a un enfermo dependiente. Los pasos a seguir para una movilización adecuada serían:

- a) Se realizará por dos celadores, colocados uno a cada lado del paciente y a la misma altura. Se enrollará la sábana deslizante por los laterales lo más próximo posible al paciente y a la vez que hacemos fuerza para subirlo, lo giramos
- b) Se efectuará por dos celadores, colocados uno a cada lado del paciente y a la misma altura. Cogerán cada uno de la entremetida pero de los bordes y sin enrollar para poder subirlo y girarlo a la vez, con menos esfuerzo y mejor resultado.
- c) Se realizará con un celador situado en el lado de la cama hacia el que se quiere girar al enfermo. Cogerá la entremetida por los dos lados del paciente y a la vez que arrastrar al paciente hacia arriba, realiza el giro del mismo.
- d) Se realizará por dos celadores, colocados en el mismo lado de la cama. Se enrollará la sábana deslizante por los laterales lo más próximo posible al paciente y a la vez que hacemos fuerza para subirlo, lo giramos.

15. Si se encuentra en el Servicio de Rehabilitación y le comunica el Fisioterapeuta que ayude a un niño que presenta una lesión en el miembro inferior derecho, para la secuencia de apoyo sobre cuatro puntos, usted debe decirle al niño:

- a) Que apoye muleta derecha, pie izquierdo, muleta izquierda, pie derecho.
- b) Que avance primero ambas muletas y la pierna afectada y luego que adelante la pierna sana soportando el peso sobre ambas muletas.
- c) Que avance simultáneamente muleta derecha y pie izquierdo, seguida de muleta izquierda y pie derecho.
- d) Dado que es una lesión unilateral con problemas inflamatorios de una articulación que causa dolor esta contraindicado la utilización de muletas.

16. Atendiendo a las directrices de la OMS sobre la higiene de las manos en la atención sanitaria, ¿Por qué nos lavaremos las manos antes de realizar una tarea limpia/aséptica?

- a) Para protegernos y proteger el entorno de atención de salud de los gérmenes dañinos del paciente.
- b) Para proteger al paciente de los gérmenes nocivos que tiene en las manos.
- c) Para proteger al paciente de los gérmenes nocivos que podrían entrar en su cuerpo, incluidos los gérmenes del propio paciente.
- d) Para proteger y protegernos de los gérmenes nocivos que tiene en las manos.

17. Las denominadas “precauciones universales” constituyen la estrategia fundamental para la prevención del riesgo laboral para todos los microorganismos vehiculizados por la sangre. Se pueden distinguir las siguientes precauciones universales, señale la opción incorrecta:

- a) Vacunación.
- b) Normas de higiene personal.
- c) Elementos de protección barrera.
- d) Limpieza y desinfección de instrumentales y superficies.

18. Cual es la posición indicada en cirugía rectal o cirugía coccígea:

- a) Morestin.
- b) Decúbito supino
- c) Kraske.
- d) Antitrendelemburg

19. La supervisora de la planta solicita al celador para que ayude a la TCAE a cambiar de posición a un paciente dependiente, desde decúbito supino a la posición de decúbito lateral ¿Cómo colocará la pierna contraria hacia el lado al que se va a realizar el giro?

- a) Se pondrá completamente estirada.
- b) Se flexionará.
- c) Es indiferente como se coloque.
- d) Se quedará en la posición que estaba.

20. De los planos corporales para el estudio anatómico, el plano medio sagital se divide en:

- a) Ventral/Anterior y dorsal/Posterior.
- b) Craneal/Superior y caudal/Inferior.
- c) Medial/Interno y lateral/Externo.
- d) Medio/Transversal y medio/Frontal.

21. El baño en la cama completo se realiza en aquellos pacientes que, conservando o no la movilidad, deben permanecer en la cama. El orden del lavado es el siguiente:

- a) 1.Cara, cuello y orejas; 2. Hombro, brazos y manos; 3. Tórax y mamas; 4. Abdomen; 5. Extremidades inferiores; 6. Espalda y nalgas; 7. Genitales externos.
- b) 1.Tórax y mamas; 2. Hombro, brazos y manos; 3. Cara, cuello y tórax; 4. Abdomen; 5. Extremidades inferiores; 6. Espalda y nalgas; 7. Genitales externos.
- c) 1.Cara, cuello y orejas; 2. Hombro, brazos y manos; 3. Tórax y mamas; 4. Abdomen; 5. Extremidades inferiores; 6. Espalda y nalgas; 7. Genitales externos.
- d) 1.Cara, cuello y orejas; 2. Hombros y tórax; 3. Mamas, brazos y manos; 4. Abdomen; 5. Extremidades inferiores; 6. Espalda; 7. Genitales externos y nalgas.

22. Si dentro del área quirúrgica se solicita a la celadora que ayude a colocar a un paciente en posición de laminectomía, debería conocer que en la misma el paciente:

- a) Se coloca en decúbito prono con alguna modificación, y con la colocación de un soporte especial que eleve el tronco por encima de la mesa de operaciones.
- b) El paciente se coloca en decúbito prono, con alguna modificación, y con la cabeza sobresaliendo al borde de la mesa y la frente apoyada en un soporte.
- c) El paciente se coloca en decúbito lateral con la espalda flexionada, piernas y caderas flexionadas, intentando acercar al máximo la cabeza y las rodillas.
- d) El paciente se coloca en decúbito supino y la cabeza y el cuerpo se bajan hasta colocarse a un nivel por debajo de las piernas y los pies.

23. Para el control químico en la Central de esterilización se utilizan:

- a) Esporas atenuadas de microorganismos dentro de ampollas de vidrio o plástico.
- b) Indicadores de presión, tiempo y temperatura.
- c) Indicadores colorimétricos compuestos por sales metálicas que viran de color.
- d) Indicadores de papel que se modifican por un indicador de arrugado.

24. ¿Cómo se denomina el tipo de cama que consta de un doble dispositivo para el volteo, que está indicada para pacientes con inmovilización absoluta?

- a) Cama de levitación.
- b) Cama de Striker.
- c) Cama roto-rest.
- d) Cama traumatológica.

25. En el orden a seguir para la colocación de la lencería de cama, después de la colcha colocaremos:

- a) La manta.
- b) La almohada con su funda.
- c) La sábana encimera.
- d) El hule

26. Tradicionalmente se distinguen una serie de usuarios habituales que acuden a los centros sanitarios para que sean atendidos. Entre ellos encontramos el influenciado y dependiente, concede gran valor a las opiniones de los demás, se acostumbra a que le trate siempre la misma persona. La actitud correcta respecto al mismo será: darle seguridad y confianza, preocuparse por él, pero no decidir por él, se trata de:

- a) Un usuario discrepador.
- b) Un usuario indeciso.
- c) Un usuario desconfiado.
- d) Un usuario imitador.

27. El antequirófano es la sala o dependencia, anexa al quirófano, que sirve para proporcionar atención y asistencia al paciente, así como llevar a cabo, los cuidados que requiera este, antes de ser operado. El celador debe permanecer durante la intervención estando atento a aquello para lo que se le pudiera requerir. Para esta zona requiere el uso:

- a) De uniforme quirúrgico, calzas o zuecos quirúrgicos y gorro, es preceptivo el uso de mascarilla.
- b) De uniforme quirúrgico, calzas o zuecos quirúrgicos y gorro, es obligatorio el uso de mascarilla.
- c) De uniforme aséptico de dos piezas, zuecos quirúrgicos o calzas, es preceptivo el gorro.
- d) De uniforme quirúrgico, calzas o zuecos quirúrgicos y gorro, es obligatorio el uso de mascarilla y los guantes.

28. En el quirófano el cirujano le pide que le traiga el escabel. ¿Se refiere?

- a) A un accesorio metálico que se fija a la mesa quirúrgica encima del paciente.
- b) A una especie de taburete o banqueta sin respaldo.
- c) A una camilla especial provista de dispositivos para modificar la altura.
- d) A una pantalla provista de un sistema de iluminación que permite visualizar radiografías.

29. En el traslado de un paciente con COVID-19 desde quirófano a la UCI, el traslado del paciente será realizado por el celador del bloque quirúrgico, la enfermera y un miembro del personal de anestesia y antes el personal sanitario irá vestido con EPI deberá realizar la higiene de manos y ponerse una bata y guantes. Idealmente, el equipo de traslado debe estar acompañado:

- a) De un miembro adicional sin bata que permita interactuar con el medio ambiente y este deberá mantener idealmente una distancia de 2 metros (1 metro mínimo) de separación con el paciente en todo momento.
- b) De un miembro adicional sin guantes que permita interactuar con el medio ambiente y este deberá mantener idealmente una distancia de 2 metros (1 metro mínimo) de separación con el paciente en todo momento.
- c) De un miembro adicional sin guantes que permita interactuar con el medio ambiente y este deberá mantener idealmente una distancia de 2 metros (1 metro mínimo) de separación con el paciente en todo momento.
- d) De un miembro adicional sin guantes que permita interactuar con el medio ambiente y este deberá mantener idealmente una distancia de 2 metros (1 metro mínimo) de separación con el paciente en todo momento.

30. En el estudio de examen interno, existen varias técnicas para la apertura de las cavidades corporales, pero la más utilizada es la técnica de Virchow que consiste:

- a) La disección de los órganos por separado, desde la cavidad abdominal, cavidad torácica, cuello y terminando con la cavidad craneal.
- b) En extraer los órganos en tres bloques, cuello y tórax, abdomen y retroperitoneo, realizándose la disección separada de cada bloque.
- c) La extracción en solo bloque de todas las vísceras y la disección se realiza fuera del cadáver.
- d) La disección de los órganos por separado, comenzando por la cavidad craneal, y siguiendo por el cuello, cavidad torácica y abdominal.

31. Ante una urgencia psiquiátrica en la que el paciente se encuentra agresivo es incorrecto:

- a) El medico y la enfermera responsable del paciente deben ser avisados de inmediato.
- b) El medico realizará una valoración continua para comprobar el estado del paciente, indicando el momento de la liberación.
- c) La sujeción se llevará a cabo por todo el equipo presente, no es necesario que este incluido el psiquiatra.
- d) El resto de pacientes no deben colaborar en este procedimiento por lo que se pedirá que se retiren.

32. El método de dispensación de medicamentos de forma individualizada solicitados desde las diferentes unidades hospitalarias por los/las supervisores/as o por los/las enfermeros/as mediante la correspondiente orden médica firmada por éste especificando la medicación diaria por paciente se denomina:

- a) Método de unidosis.
- b) Método tradicional.
- c) Método de dosis única.
- d) Las opciones a y c son correctas.

33. Durante su permanencia en el servicio de farmacia, observa cómo los celadores del almacén preparan un pedido, recogiendo el diverso material que compone de los lugares en los que se encuentra depositado, agrupándolo en otra zona del almacén, a fin de facilitar su distribución a las plantas de hospitalización. A esta actividad se le denomina:

- a) Picking
- b) Packing
- c) Just in time.
- d) Push back.

34. Los dispositivos de vigilancia radiológica individual, y miden la dosis absorbida durante el tiempo de exposición normalmente a nivel laboral u ocupacional se denomina:

- a) Antinómetro.
- b) Dosímetro.
- c) Pulxiómetro.
- d) Radiómetro.

35. Los residuos sanitarios del grupo III, se identificarán por el rótulo indicativo de precaución y llevará la leyenda:

- a) "Residuos específicos".
- b) "Residuos de riesgo".
- c) "Residuos infecciosos"
- d) "Residuos de material contaminado"

36. El concepto en el Plan de Autoprotección sobre la situación declarada con el fin de tomar precauciones específicas debido a la probable y cercana ocurrencia de un suceso o accidente se denomina:

- a) Alarma.
- b) Alerta.
- c) Intervención
- d) Riesgo.

37. El Plan Integral de Prevención de la Agresiones en el Entorno Sanitario. La violencia laboral en la que existe algún tipo de implicación laboral entre el agresor o agresora y la víctima se denomina:

- a) Violencia tipo 1
- b) Violencia tipo 2
- c) Violencia tipo 3
- d) Violencia tipo 4.

38. En caso de que Ud. en el ejercicio de sus funciones como celador/a tenga un accidente de trabajo mientras desarrolla sus funciones en un área asistencial debe comunicar el accidente o incidente a través del formulario CAT a esta norma se exceptúan, por su urgencia:

- a) Accidentes en la entrada de la Institución Sanitaria.
- b) Accidentes por agente biológicos.
- c) Accidentes in itinere.
- d) Accidentes con mobiliario de la unidad asistencial.

39. El lavado de manos debe realizarse al comenzar y al terminar la jornada. Según la OMS en el procedimiento de como lavarse las manos, tras realizar el paso de frotarse con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa realizaremos:

- a) La frotación del dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos.
- b) La frotación de la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa.
- c) La frotación de las palmas de las manos entre si, con los dedos entrelazados.
- d) La frotación de la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa.

40. Atendiendo a las reglas generales para la utilización del uso de un extintor portátil, tras descolgarlo por la maneta o asa y dejarlo sobre el suelo en posición vertical deberemos:

- a) Presionar la palanca de la cabeza del extintor y, en caso de que exista, apretar la palanca de la boquilla realizando una pequeña descarga de comprobación.
- b) Asir la boquilla de la manguera del extintor y comprobar, en el caso de que exista, que la válvula o disco de seguridad esta en posición sin riesgo para el usuario.
- c) Dirigir el chorro a la base de las llamas con movimiento de barrido.
- d) Probar la dirección del chorro para evitar la proyección superficial y provocando que se derrame.



País Valencià

Planilla Respuesta Simulacro Celadores UGT-SP-PV

1	A	11	B	21	C	31	C
2	B	12	B	22	A	32	D
3	D	13	B	23	C	33	A
4	B	14	A	24	B	34	B
5	B	15	A	25	B	35	B
6	B	16	C	26	D	36	B
7	D	17	D	27	B	37	C
8	B	18	C	28	B	38	B
9	C	19	B	29	B	39	B
10	C	20	C	30	D	40	B